

EQUAL Candida Score 2018: Az ECMM által létrehozott, aktuális irányelveken alapuló pontrendszer, melynek segítségével mérhetővé válik a candidaemia klinikai ellátásának minősége


Cornely OA^{1,2}, Köhler P^{1,2}, Mellingshoff SC^{1,2}, Sinkó J³

¹ Department I for Internal Medicine, Excellence Center for Medical Mycology (ECMM), University of Cologne, Germany;

² CECAD Cluster of Excellence, University of Cologne, Germany; ³ Department of Hematology and HSCT, South-Pest Central Hospital, National Institute of Hematology and

Infectious Diseases, Budapest, Hungary

DOI: 10.4126/FRL01-006410985



Háttér

Az EQUAL Candida Score a candidaemia ideális ellátásához javasolt felételeket súlyozza és összesíti. Ezzel eszközként szolgál mind az antifungális stewardship területén, mind az irányelvek követésének mérésében. Az *European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases*^{4,5} és az *Infectious Diseases Society of America*³ hatályos irányelveit áttekintve, az ellátás minőségét érintő leghatározottabb ajánlások szolgáltak az értékelési rendszer alapjául.

Maximális pontszámok

Centrális kanül nincs

Diagnózis

10

Terápia

7

Követés

2

Összesen

19

Centrális kanül van

Diagnózis

10

Terápia

10

Követés

2

Összesen

22

Irodalom

1. Mellingshoff et al. *Mycoses* 2018; 2. Koehler et al. *Mycoses* 2014; 3. Pappas et al. *Clin Infect Dis* 2016; 4. Cuenca-Estrella et al. *Clin Infect Dis* 2012; 5. Cornely et al. *Clin Microbiol Infect* 2012; 6. Munoz et al. *Diagn Microbiol Infect Dis* 2017; 7. Andes et al. *Clin Infect Dis* 2012.

EQUAL Candida Score 2018 ^{1,2}

Diagnózis

Kezdeti hemokultúra (40mL) ^{3,4}

3

Species identifikálás ^{3,4}

3

Érzékenységi vizsgálat ^{3,4}

2

Echocardiographia ^{3,5}

1

Szemfenék vizsgálat ^{5,6}

1

Terápia

Echinokandin terápia ^{3,5}

3

Az érzékenységi vizsgálat eredményének függvényében visszaváltás flukonazolra ^{3,5}

2

Kezelés az első negatív follow-up hemokultúra után 14 napig ^{3,5}

2

Centrális kanült viselők*: kanüeltávolítás ^{3,5,7}

3

A diagnózist követően 24 órán belül

A diagnózishoz képest > 24 < 72 órán belül

2

* A kanülviselők plusz pontokat kapnak, ez befolyásolja az elérhető összesített értéket

Követés

Follow-up hemokultúra (legalább napi egy, amíg negatív nem lesz) ^{3,5}

2



UNIKLINIK
KÖLN

European Confederation of Medical Mycology



Center of Excellence in Clinical and
Laboratory Mycology and Clinical Studies